

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Cystinol® N Lösung

... Zusammensetzung

10 ml entsprechend 12,00 g Lösung (2 Messkappen) enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

0,9 g Auszug aus Bärentraubenblättern (3 - 4 : 1), Auszugsmittel: Wasser

0,6 g Auszug aus Echtem Goldrutenkraut (3 - 7 : 1), Auszugsmittel: Ethanol 13 % (m/m)

Sonstige Bestandteile:

Ethanol, Maltitol-Sirup (Ph. Eur.), Acesulfam-Kalium, Gereinigtes Wasser

Ethanol-Gehalt 24 Vol.-%

... Darreichungsform und Inhalt

Cystinol® N Lösung ist in Packungen mit 100 ml (N1) und 200 ml (N2) Lösung erhältlich.

... Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Pflanzliches Arzneimittel bei Harnwegserkrankungen

... Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers:

Schaper & Brümmner GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 35, 38259 Salzgitter

Telefon (05341) 307-0 · Telefäx (05341) 307-124 · info@schaper-bruemmer.de

www.schaper-bruemmer.com

... Anwendungsgebiete

Unterstützend zu ausreichender Flüssigkeitszufuhr und Wärmebehandlung bei entzündlichen (auch bakteriell bedingten) Erkrankungen der ableitenden Harnwege wie:

- Entzündungen des Harnleiters (Ureteritis)
- Blasenentzündung (Cystitis), Reizblase
- Entzündungen der Harnröhre (Urethritis)

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder Anhalten der Beschwerden über 7 Tage ist ein Arzt aufzusuchen.

... Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Cystinol® N Lösung nicht einnehmen?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Bärentraubenblättern und/oder Goldrutenkraut darf Cystinol® N Lösung nicht eingenommen werden. Auch bei Wassereinlagerungen (Ödeme) infolge von eingeschränkter Herz- oder Nierenfunktion darf keine Durchspülungstherapie erfolgen.

... Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen Sie beachten?

Dieses Arzneimittel enthält 24 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (10 ml) bis zu 1,9 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.


Was ist bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung von Cystinol® N Lösung bei Kindern liegen keine ausreichenden Daten vor. Cystinol® N Lösung soll deshalb von Kindern unter 12 Jahren nicht eingenommen werden.

Was ist in der Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Zur Anwendung von Cystinol® N Lösung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit liegen keine ausreichenden Daten vor.

Cystinol® N Lösung soll deshalb in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht eingenommen werden.



... Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

... Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen-Ihr Arzt Cystinol® N Lösung nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cystinol® N Lösung sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Cystinol® N Lösung einnehmen?

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre nehmen 3-mal täglich 2 Messkappen mit 5 ml Lösung, entsprechend einer Tagesdosis von 30 ml Lösung ein.

Wie und wann sollten Sie Cystinol® N Lösung einnehmen?

Die Lösung sollte mit reichlich Flüssigkeit nach den Mahlzeiten eingenommen werden. Bitte beachten Sie, dass nicht nur bei Einnahme, sondern während des ganzen Tages reichlich Flüssigkeit zugeführt wird, da Cystinol® N Lösung sonst nicht richtig wirken kann.

Wie lange sollten Sie Cystinol® N Lösung einnehmen?

Cystinol® N Lösung soll ohne ärztlichen Rat nicht länger als jeweils 1 Woche und höchstens 5mal jährlich eingenommen werden .

... Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Cystinol® N Lösung in zu großen Mengen eingenommen wurde?

Von Cystinol® N Lösung soll pro Tag nicht mehr eingenommen werden, als in der Dosierungsanleitung angegeben oder vom Arzt verordnet. Wenn Sie versehentlich 5 oder 10 ml (entsprechend 1 oder 2 Messkappen) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Die Einnahme von deutlich darüber hinaus gehenden Mengen kann jedoch Beschwerden (z.B. Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit und Erbrechen) hervorrufen. In diesem Falle, auch wenn noch keine Beschwerden aufgetreten sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Cystinol® N Lösung eingenommen oder eine Dosis vergessen haben?

Holen Sie bitte die vergessene Einnahme nicht nach, sondern setzen Sie beim nächsten Mal die Einnahme von Cystinol® N Lösung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben bzw. wie verordnet, fort.

... Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cystinol® N Lösung auftreten?

In Einzelfällen können Magen-Darm-Störungen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

... Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist außen auf der Packung und dem Flaschenetikett aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 3 Monate haltbar.

Die bei flüssigen Naturstoffpräparaten gelegentlich auftretenden Nachtrübungen sind ohne Einfluss auf die Wirksamkeit und Haltbarkeit.

Bitte vor Gebrauch schütteln!

Hinweis:

Das Arzneimittel nicht über 25°C lagern; nicht im Kühlschrank aufbewahren!

... Stand der Information

–Oktober 2004–

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Weitere Informationen zu **Cystinol® N Lösung** finden Sie auch im Internet unter www.Cystinol.de